

FLORAISONS OBSERVÉES DANS LES SERRES DU MUSÉUM
PENDANT L'ANNÉE 1930
(AUTRES QUE CELLES SIGNALÉES DANS LES LISTES PRÉCÉDENTES) ⁽¹⁾,

PAR M. D. BOIS.

MONOCOTYLÉDONES.

Aloe concinna Bak.

Amomum monophyllum Gagnepain, Indo-Chine? (*Delacour*)?

Billbergia × **Poupionii** Guillaumin (*nutans* × *speciosa*).
(Croisement non signalé dans les monographies).

Calathea zebrina Lindl.

Cordyline rubra Hugel ex Kunth (Guillaumin det.)

Dendrobium clavatum Lindl.

— *superbum* Reichb. f., var. **Delacouri** Gagnep. et
Guillaum. (Gagnepain et Guillaumin det.) ⁽²⁾.

Gasteria albicaulis Hort ⁽³⁾.

Haworthia atrovirens Haw. (Guillaumin det.).

— *fasciata* Haw., var. *major* Salm. (Guillaumin det.).

Homalonema aromatica Schott.

Peliosanthes violacea Wall.

Reineckea carnea Kunth.

DICOTYLÉDONES.

Abutilon megapotamicum St. Hil.

Acacia excelsa Benth.

— *juniperina* Willd.

— *uncinella* Benth.

⁽¹⁾ Voir pour les années précédentes le *Bulletin du Muséum* à partir de 1920.

⁽²⁾ Diffère du type par les fleurs pâles, blanc lilacé, les macules du labelle et l'anthère étant seules violet foncé. Laos : (*Delacour*, f. 200, 1930).

⁽³⁾ Donné par de Noter f. 158, 1923, probablement hybride entre *Gasteria fasciata* et *sulcata*.

Acalypha Wilkesiana Mull.-Arg. form. *illustris* J. J. Sm. ⁽¹⁾.
(Guillaumin det.).

Albizzia Neumanniana Heyhn.

Alloplectus Lynchii Hook. f. (Guillaumin det.).

Aphelandra cristata R. Br. (Guillaumin det.).

— *fulgens* Dcne. (Guillaumin det.).

Begonia acerifolia H. B. et K.

— *microphylla* A. DC.

Biophytum dormiens G. Don.

Brachysema lanceolatum Meiss.

Cereus Spegazzinii Schum. var. *Anisitsii*. Férard, comb. nov. =
Cereus Anisitsii Schum (Férard det.).

Codiaeum × B. Comte, Comte.

— × Mademoiselle Marie Duval, Duval.

— × M. Maurice Rouvier, Draps.

Cotyledon linguæfolia, var. *pulverulenta*.

Euphorbia fulgens Karw.

Gymnocalycium Mihanovichii Britt. et Rose ⁽¹⁾ (*Fric.*, f. 5,
1928) ⁽²⁾.

Haltiera bambusoides Britt. et Rose.

Hibiscus Manihot L.

Kalanchoe × *cantabrigensis* Hort. Cantab. ex Guillaumin. (*de*
Noter, f. 158, 1923).

Laportea Gigas Wedd.

Leea sambucina Willd.

Maytenus Boaria Molina.

Mesembryanthemum glomeratum L.

— *Lehmannii* Eckl. et Zeyh.

Mimosa Denhardtii Hort., ex L. H. Bailey.

Perrierastrum oreophilum Guillaumin. gen. et sp. nov. (Guil-
laumin det.). Madagascar : Massif d'Andringitra (*Perrier de la*
Bâthie, f. 172, 1921, n° d'herbier 13.729).

Phyllocactus × *ruber-perfectus* Simon.

Rondeletia odorata Jacq.

Sonerila margaritacea Lindl., var. *Hendersonii* Hort.

⁽¹⁾ Une grande confusion paraît exister entre les diverses formes et variétés d'*Acalypha Wilkesiana* Müll-Arg.

Le type est à feuilles marbrées rouge et carmin sur fond vert cuivré avec pétiole court, la plante connue sous le nom d'*A. musaica* serait donc typique; quant à celle à feuilles vert olive, vaguement marbrées de vert jaunâtre et à pétiole long, elle serait la forme *illustris* J. J. Sm. (cfr. PAX ET HOFFMANN, *Pflanzenreich*, IV, 147, XVI, pp. 153, 154) (A. G.).

⁽²⁾ Suivant l'envoyeur, cette plante proviendrait d'hybridations réalisées par De Lact entre *G. Mihanovichii* et *G. Anisitsii*, *Damsii*, etc. Elle est cependant en tous points identique à la plante typique (A. G.).

— × Mr van Bockxstaele, van Houtte, 1894 ⁽¹⁾.

— × M^{me} de Warelles ⁽²⁾.

Streptocarpus × *achimenæflorus* Veitch (*S. polyanthus* × *S.*
hybride blanc, de Veitch).

— *Riexii* Lindl., forme péliorée.

Strobilanthes crispus Bl.

Thylachium panduræforme Juss.

Withania somnifera Dun.

(¹) Présenté en 1894 à la Société royale d'Horticulture de Londres et au Meeting de la Chambre des Horticulteurs belges ; figure pour la première fois sur le *Catalogue* de van Houtte n° 262, p. IV (1895), mais sans description ni indication des parents. A déjà fleuri en 1924. (A. G.).

(²) Figure sur le *Catalogue* de van Houtte après 1914, le premier pied mis au commerce viendrait de chez M. le vicomte de Warelles, vers 1890. (van Houtte *in litt.* 17 novembre 1930).